Impact de notre quotidien sur la qualité des eaux

Développement d'un nouvel outil de diagnostic pour évaluer la qualité des eaux de la Meuse

Patrick Kestemont

Unité de Recherches en Biologie Environnementale et Evolutive
Institute of Life, Earth & Environment (ILEE), Université de Namur

Milieus aquatiques exutoires d'un grand nombre de contaminants en lien avec les activités anthropiques

Les stations d'épuration (STEP)

110 000 substances chimiques sur le marché communautaire
Dont 3000 substances pharmaceutiques

STEP efficace pour l'élimination de la MO et macro-contaminants :
Perturbateurs endocriniens et résidus pharmaceutiques ?

Services écosystémiques (Biodiversité, Potabilisation...) des milieux récepteurs

Identification du problème

- Dès les années 80', observation par les pêcheurs anglais d'un taux élevé d'hermaphrodisme parmi des gardons pêchés en rivière en aval des STEPs

- Encagement de truites en aval de STEP: tous les mâles contiennent une protéine spécifique aux femelles – la vitellogénine (VTG) (Purdom et al., 1994)

Causes identifiées

- **Nonylphénol** et **Octylphénol** dans les effluents industriels et domestiques
- **17b-estradiol (E2)** et **Ethyniloestradiol (EE2)**: substances très fortement oestrogéniques, relâchées dans les effluents de STEP

Qu'en est-il en Wallonie?

Etude menée en 2010-2011 par l'Université de Namur

- Comparer l'efficacité d'élimination des xénoestrogènes par différents types de STEP implantées en Wallonie

- Déterminer si les concentrations actuelles en aval de STEP sont susceptibles de perturber le contrôle du sexe chez les poissons

Méthodologie : suivi de 10 STEP avec traitement 1^{ère} à 4^{ème}

STEP	Type	E.H.
Rochefort	S: Boues activées	23 700
Bastogne	S: Boues activées	17 500
Trivières	S: Boues activées T: déphosphatation	19 000
Ciney	S: Boues activées T: déphosphatation	16 000
Plombière	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification	24 750
Marche	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification	24 400
Malmedy	S: Lagunage	20 000
Bertrix	S: Lagunage	8 500
Morlanwelz	S: Lit bactérien	18 000
La Roche	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification Q: U.V.	11 500

Méthodologie : culture cellulaire in vitro de MCF-7

1. Monitoring de 10 STEP en Région wallonne
2. Echantillonnage de 2L d'eau
IN/OUT → extraction
3. Mesure de l'oestrogénicité sur des cultures de cellules cancéreuses du sein de la lignée MCF-7
→ croissance œstrogène-dépendante

Méthodologie : échantillonnage de poissons *in situ*

- Prélèvements de goujons en amont et aval de 6 STEPs
 - ➔ Echantillonnage de foie et gonades
- Mesure de biomarqueurs d'exposition aux xénoestrogènes
 - ➔ Analyse morphologique (RGS)
 - ➔ Analyse histopathologique (gonades)
 - ➔ Expression de la VTG par Q-PCR (foie)

Efficacité d'élimination des xénoestrogènes

STEP	Type	EEQ (ng/L)		
		Influent	Effluent	% élimination
Rochefort	S: Boues activées	23,8	5,4	77,3
Bastogne	S: Boues activées	33,3	1,2	96,3
Trivières	S: Boues activées T: déphosphatation	9,7	2,7	72
Ciney	S: Boues activées T: déphosphatation	12,1	0,7	93,8
Plombière	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification	12,7	0,5	95,9
Marche	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification	62,1	0,8	98,7
Malmedy	S: Lagunage	36,5	7,0	80,7
Bertrix	S: Lagunage	38,8	8,5	78
Morlanwelz	S: Lit bactérien	6,5	2,4	62,6
La Roche	S: Boues activées T: déphosphatation T: dénitrification Q: U.V.	4,8	0,8	83,15

$$\% \text{ élimination} = \text{EEQ}_{\text{eff}} / \text{EEQ}_{\text{inf}}$$

Conclusions de cette étude préliminaire

- *Les STEP de Wallonie sont capables de réduire significativement les rejets de substances oestrogéniques provenant des eaux usées domestiques, entre 63 et 99%*
- *La capacité d'élimination des xénoestrogènes est variable, indépendante du type de STEP*
- *Des effets sur le développement des gonades de poissons sont observés, indiquant des signes de féminisation, mais les différences amont/aval sont peu marquées*

Limitations de l'étude et perspectives

- *Les analyses basées sur des prélèvements de poissons en milieu naturel nécessitent de sécuriser l'origine des poissons capturés*
- *Qu'en est-il de l'efficacité des STEP vis-à-vis des résidus de substances pharmaceutiques?*

Voies d'introduction des médicaments dans l'eau destinée à la consommation humaine

Bilan pour divers composés présents dans les eaux usées

- Fraction perdue par dégradation
- Fraction dans les eaux traitées
- Fraction dans les boues

Variations de concentrations de quelques substances pharmaceutiques

	Entrée de station d'épuration	Sortie de station d'épuration	Cours d'eau Lacs	Captage
<p>Diclofenac</p>	0,105-4,11 µg/L	0,035-2,5 µg/L	0,001-3,2 µg/L	0,005-0,38 µg/L
<p>Ethinylestradiol</p>	0,0008-0,0028 µg/L	0,0002-0,042 µg/L	0,001-0,003 µg/L	pas de données
<p>Ibuprofène</p>	0,170-59,2 µg/L	0,002-24 µg/L	0,001-27 µg/L	0,0006-0,200 µg/L
<p>Paracétamol</p>	55,3-292 µg/L	jusqu'à 2 µg/L	0,03-250 µg/L	déTECTÉ

Développement d'un nouvel outil de diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse – DIADeM

Surveillance « efficace » des masses d'eau

Exposition

Approches analytiques des contaminants

Effets/impacts

Approches biocénétiques (diversité, fonction)

Dépasser les limites des approches actuelles

Développement d'un nouvel outil de diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse – DIADeM

Surveillance « efficace » des masses d'eau

Exposition

Approches analytiques
des contaminants

Effets/impacts

Approches biocénétiques
(diversité, fonction)

Développer des indicateurs de toxicité au niveau individuel,
prédictifs des effets écologiques (lien exposition-effet)

Développer des réponses sensibles et prédictives pour une amélioration du diagnostic

Chimie (milieu et biote)

Mieux définir la fraction représentant un risque toxique pour les organismes (fraction biodisponible - bioaccumulable)

Développer des réponses sensibles et prédictives pour une amélioration du diagnostic

Chimie
(milieu et
biote)

Réponses
moléculaires

Développement de réponses moléculaires, à fort pouvoir prédictif

Développer des réponses sensibles et prédictives pour une amélioration du diagnostic

Etablir les liens entre les niveaux moléculaire et individuel – populationnel d'intérêt écologique : modélisation

Développer des réponses sensibles et prédictives pour une amélioration du diagnostic

Chimie (milieu et biote)

Modélisation

Réponses moléculaires

Approche plurispécifique

(espèces représentatives des hydrosystèmes de l'interrégion)

Approche active

Développer des réponses sensibles et prédictives pour une amélioration du diagnostic

Chimie (milieu et biote)

Modélisation

Réponses moléculaires

Approche de co-construction
avec les organismes
gestionnaires/utilisateurs des
masses d'eau

Sensibilisation du public

- Développement d'une approche interrégionale commune
- Positionnement idéal du bassin de la Meuse
- Considération de la diversité des hydrosystèmes (Meuse – Sambre – Semois)

http://www.epama.fr/files_fr/epama_meuse/epama_meuse_carte.php4#

Organisation du projet (Modules de travail)

Organisation du projet (Modules de travail)

Acquisition de données

Phase 2

8 partenaires opérateurs

Développement d'une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse

7 partenaires associés